

A RÁKOK

Mutassa be néhány weblapon a hazai legismertebb rákokat a következő leírás és minta szerint!

- Az elkészítendő három állomány neve legyen **rak1.html**, **rak2.html** és **rak3.html**!
- A feladat megoldásához szükséges forrásszöveg és képek: **rak_forras.txt**, **rakrajz.png**, **folyami.jpg**, **kecske.jpg**, és **kovi.jpg**.

1. Az oldalak szerkezete azonos. Az oldal jellemzőinél állítsa be, hogy a háttér kékesszürke (#99ACB2 kódú szín), a szöveg sötétebb árnyalatú (#192C32 kódú szín)! A linkek minden állapotban piros (#CC0000 kódú szín) legyen!
2. A tartalom mindhárom oldalon egy olyan táblázatban helyezkedik el, amelynek tulajdonságai:
 - öt sort tartalmaz, az első sor három cellából, a többi egy-egy vízszintesen összevont cellából áll,
 - a szélesség 1000 képpont,
 - a háttérszín világosszürke (#E8E3E0 kódú szín),
 - a szegély mérete 0 képpont,
 - a cellaköz 0 képpont,
 - a cellamargó 5 képpont,
 - a táblázat az oldal közepén jelenik meg.
3. Az első sor három cellájába illessze be a folyami rákot ábrázoló rajzot (**rakrajz.png**), a **képeket** helyezze vízszintesen középre!
4. A második sor cellájában a „Tíz lábú rákok” cím egyes szintű címsor stílusú és vízszintesen középre igazított.
5. A rákfajokról szóló szövegrészek a harmadik, a negyedik és az ötödik sor celláiban jelennek meg. A fajnevek második szintű címsor stílusúak.
6. Az eddig elkészített tartalmakat mentse el a **rak1.html**, a **rak2.html** és a **rak3.html** állományokba! A szerkesztés további lépései az oldalakon eltérők.
7. Az oldalakon egy-egy faj leírása világosszürke (#E8E3E0 kódú szín) háttérszínnel kiemelten jelenik meg. A böngésző keretén megjelenő cím szövege a fajnévvel azonos legyen!
8. A másik két faj cellájának háttérszíne kékesszürke (#99ACB2 kódú szín). Ezekben a cellákban az alcímek hivatkozások, amelyek a másik két oldalra mutatnak.
9. Egy-egy oldalon mindig a kiemelt rákfaj képe jelenjen meg a táblázat cellájában vízszintesen középen, 1 képpontos szegéllyel! A másik két oldalon ezek a képek ne látszódjanak!



Magyarország legfejlettebb rákjai. Hosszú potrohú, mészpáncéllal fedett vízi állatok. Őt járólábuk közül az első nagyméretű ollóvá alakult. Növekedés közben kinőtt páncéljaikat levedlik.

Olajzöld, vagy sötétszürke 15-25 cm nagyságú. A folyami rákok, hogy növekedhessenek, életük során, évente 1-2 szer levetik páncéljukat. A védés nagyon igénybe veszi a rákokat, mivel a páncélt először megrepszti, majd egész testének mozgásával kibújik a páncéljából. A kibújó rák bőre puha, ezért sok veszélyt leselkedik rá.



Magyarország legfejlettebb rakkjai. Hosszú potrohú, mészpáncéllal fedett vízi állatok. Öt járójáruk közül az első nagyméretű ollóvá alakult. Növekedés közben kinőtt páncéljaikat levedlik.

Olajzöld, vagy sötétszürke 15-25 cm nagyságú. A folyami rákok, hogy növekedhessenek, életük során, évente 1-2 szer levetik páncéljukat. A védős nok igénybe veszi a rákokat, mivel a páncélt először megrepeszt, majd egész testének mozgásával kibújik a páncéljából. A kibújó rák bőre puha, ezért sok veszélyt leselkedik rá.

Nemes ráknak is nevezik, mivel elég keresett a piacon. Emberi fogyasztásra nagyon alkalmas. Főleg tiszta folyókban, patakokban él. Dögevő.

Színe fölül sűrűs, vagy sárgászöld – szemének nyele élénkpiros. 20-26 cm nagyságú. Olói nyúlabbak, mint a folyami ráké, fejtor-pajzsoldalai dúsan tuskécs és félkörös nyakbarázdájának két végén erős, hajlott fog van. A kecserák mindenevő, táplálékát főleg férgek, csigák és kagylók alkotják, de egyéb állatokkal, sódóécs is fogvazt. Balatonban evakori.



Magyarország legfejlettebb rákjai. Hosszú potrohú, mészpáncéllal fedett vízi állatok. Öt járólábuk közül az első nagyméretű ollóvá alakult. Növekedés közben kinőtt páncéljaikat levedlik.

Olajzöld, vagy sötétszürke 15-25 cm nagyságú. A folyami rákok, hogy növekedhessenek, életük során, évente 1-2 szer levetik páncéljukat. A védős lemez igénybe veszi a rákokat, mivel a páncélt először megrepszti, majd egész testének mozgásával kibújik a páncéljából. A kibújó rák bőre puha, ezért sok veszélyt lesekedik rá.

Nemes ráknak is nevezik, mivel elég keresett a piacon. Emberi fogyasztásra nagyon alkalmas. Főleg tiszta folyókban, patakokban él. Dögevő.

Színe fölül szürkés, vagy sárgászöld – szemének nyele élénkpiros. 20-26 cm nagyságú. Ollói nyúltabbak, mint a folyami ráké, fejtor-pajzsoldalai dúsan tüskések és félkörös nyakbarázdaíjának két végén erős, hajlott fog van. A kecskerák mindenevő, táplálékát főleg férgek, csigák és kagylók alkotják, de egyéb állatokat, sőt dögöt is fogyaszt. Balatonban gyakori.

10-12 cm nagyságú. A piacon nem keresett, mivel az ollók kicsik. A tizlábú rákok között ez a legkisebb hazai faj. Néhány felvidéki és dunántúli (például Pilis, Börzsöny, Kézegi-hegység) patakban fordul elő. A kővi rák tiszta vízű, kavicsos vagy köves medrű patakokban, a kövek alatt tartózkodik. A kővi rák faroklegyezőjének lökesszerű csapásaival és potrohának begörbítésével úszik hátrafelé. Alkonyat után szeret jární. A kővi rák mindenevő, táplálékát főleg férgek, csigák és kagylók alkotják, de egyéb állatokat, sőt dögöt is fogyaszt.

